

Cetrotide^{MD}

Cétrorélix pour injection

0,25 mg

Directives pour l'administration et l'entreposage



Une seringue préremplie



Avant de commencer:

1. Nettoyez votre plan de travail avec du savon et de l'eau.
2. Lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon.
3. Étalez tout ce dont vous avez besoin sur une surface propre (un flacon de CETROTIDE, une seringue préremplie, une aiguille de mélange [marque jaune] et une aiguille pour l'injection [marque grise]).
4. Assurez-vous d'avoir de l'alcool isopropylique ou éthylique dans la forme pratique telle que lingettes désinfectantes, bouteille à utiliser avec des tampons de coton, etc.



Étape 1

Enlevez le capuchon protecteur du flacon de CETROTIDE.



Étape 2

Essuyez l'anneau en aluminium et le bouchon en caoutchouc avec de l'alcool isopropylique/éthylique.




Étape 3

Prenez la seringue préremplie de diluant et enlevez le capuchon en dévissant et en tirant.



Étape 4

Prenez l'aiguille de mélange jaune, puis dévissez l'embout jaune pour l'enlever. Vissez fermement l'aiguille sur la seringue préremplie. En tenant le cylindre en verre, retirez délicatement le capuchon de l'aiguille.



Étape 5

Insérez l'aiguille dans le centre du bouchon en caoutchouc du flacon de CETROTIDE. Injectez l'eau dans le flacon en poussant lentement le piston de la seringue. Dissolvez la poudre CETROTIDE seulement avec l'eau contenue dans la seringue préremplie.




Étape 6

Sans retirer l'aiguille du flacon, agitez ou tournez **doucement** le flacon jusqu'à ce que la solution soit limpide et sans particules. Il faudra peut-être quelques minutes pour que le contenu du flacon se dissolve.


Évitez la formation de bulles.

IMPORTANT : N'utilisez pas la solution si elle est trouble, si elle contient des particules en suspension ou si elle a une couleur anormale.




Étape 7

Prélevez tout le contenu du flacon dans la seringue. S'il y a du liquide qui reste dans la seringue, inversez le flacon, retirez l'aiguille jusqu'à ce que l'ouverture de l'aiguille soit juste à l'intérieur du bouchon. Si vous regardez sur le côté par le trou dans le bouchon, vous pouvez contrôler le mouvement de l'aiguille et du liquide. Il est important de prélever tout le contenu du flacon. Faites attention de ne pas sortir le piston de la seringue.



Étape 8

Retirez l'aiguille du flacon. Remettez délicatement le capuchon sur l'aiguille.



Étape 9

Dévissez l'aiguille de la seringue. Jetez l'aiguille de mélange dans un contenant réservé à cette fin. Déposez avec soin la seringue sur une surface propre.



Étape 10

Prenez l'aiguille grise pour injection, puis dévissez et retirez l'embout gris. Vissez fermement l'aiguille sur la seringue préremplie. En tenant le cylindre en verre, retirez délicatement le capuchon de l'aiguille.



Étape 14

Prenez la seringue et enlevez le capuchon de l'aiguille.



11 a

Étape 11


a. Tenez la seringue avec l'aiguille pointée vers le haut et tapez doucement la seringue pour voir s'il y a des bulles d'air. Les bulles d'air se regrouperont dans la partie supérieure de la seringue.

b. S'il n'y a pas de bulles d'air, ou s'il n'y a pas d'espace d'air dans la partie supérieure de la seringue, tirez le piston pour qu'il y ait un espace d'air de 0,1 mL. Remplacez le capuchon sur l'aiguille avec soin et déposez la seringue sur une surface propre.

IMPORTANT : Il doit y avoir un espace d'air dans la seringue avant l'injection. C'est ce qui assurera que tout le médicament a été injecté.



11 b



Étape 12

Choisissez un site d'injection : CETROTIDE doit être injecté sous la peau dans la paroi abdominale inférieure.

Choisissez un site d'injection différent chaque jour afin de minimiser les risques d'irritation locale.



Étape 13

Nettoyer la peau au site d'injection utilisant de l'alcool isopropylique/ éthylique et laisser sécher. Gardez le tampon utilisé à portée de la main.



Étape 15

Inversez la seringue en la tenant comme s'il s'agissait d'une fléchette à lancer.

De l'autre main, pincez délicatement la peau au site d'injection de manière à ce qu'elle forme un repli.



Étape 16

D'un mouvement vif (comme si vous lanciez une fléchette), introduisez l'aiguille dans la peau à un angle de 90 degrés.

IMPORTANT : Pour l'injection, il faut très peu de force, mais un geste vif.



Étape 17

Une fois que l'aiguille est enfoncée dans la peau, injectez la solution en poussant doucement le piston avec la main qui tient la seringue.

Prenez le temps qu'il faut pour injecter toute la solution.



Étape 18

Retirez immédiatement l'aiguille et nettoyez le site avec votre lingette à l'alcool isopropylique/ éthylique à l'aide d'un mouvement circulaire. S'il y a un léger suintement, vous devrez peut-être appliquer un peu de pression pendant une minute.

Une fois l'injection terminée, jetez immédiatement l'aiguille et la seringue dans un contenant prévu à cet effet.

Foire aux questions

Quels sont les ingrédients de CETROTIDE ?

CETROTIDE contient de l'acétate de cétrorélix et du mannitol comme ingrédient inactif.

Pourquoi CETROTIDE est-il utilisé ?

CETROTIDE empêche dans votre organisme la libération d'un ovule par l'ovaire (ovulation). Il est utilisé dans le cadre des techniques de reproduction assistée pour vous aider à devenir enceinte.

Comment CETROTIDE agit-il ?

CETROTIDE bloque l'effet d'une hormone naturelle, appelée gonadolibérine (GnRH). La GnRH contrôle la sécrétion d'une autre hormone, l'hormone lutéinisante (LH). La LH est l'hormone qui commence l'ovulation (libération de l'ovule) au cours du cycle menstruel. CETROTIDE règle l'ovulation afin qu'elle ait lieu au meilleur moment pour que vous tombiez enceinte.

Comment devrais-je utiliser CETROTIDE ?

CETROTIDE (cétrorélix pour injection) peut s'administrer par voie sous-cutanée, une fois par jour (dose de 0,25 mg) dans le cadre d'un protocole multidosé au début ou au milieu de la phase folliculaire. Une dose de 0,25 mg de CETROTIDE (cétrorélix pour injection) est administrée au jour 5 de la stimulation (le matin ou le soir) ou au jour 6 (le matin). Elle est administrée une fois par jour, à la même heure et en respectant un intervalle de 24 heures, et jusqu'au jour de l'administration de l'hCG.

Qui ne doit pas utiliser CETROTIDE ?

Ne prenez pas CETROTIDE si :

- vous êtes allergique au cétrorélix ou au mannitol, qui sont les ingrédients de CETROTIDE
- vous êtes allergique à tout composant du contenant de CETROTIDE
- vous êtes allergique à des médicaments appelés hormones peptidiques
- vous êtes allergique à une hormone appelée gonadolibérine (GnRH) ou à des médicaments appelés analogues de la GnRH
- vous êtes enceinte ou pensez être enceinte
- vous allaitez
- vous avez des problèmes de foie modérés ou graves
- vous avez des problèmes de rein modérés ou graves

Que dois-je faire si j'administre plus que la dose prescrite de CETROTIDE ?

Si vous croyez avoir pris trop de CETROTIDE, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Que dois-je faire si j'oublie de prendre une dose ?

Si vous avez oublié de prendre une dose de CETROTIDE, ne pas doubler la dose. Discuter avec votre médecin du moment auquel vous devez recevoir votre prochaine dose. Veuillez vérifier avec votre médecin si vous avez des questions à ce sujet.

Combien de temps puis-je conserver CETROTIDE après la préparation de la solution ?

La solution devrait être utilisée immédiatement après sa préparation. Chaque flacon et chaque seringue ne doivent être utilisés qu'une seule fois.

Quels sont les effets secondaires possibles ?

Les effets secondaires peuvent comprendre ce qui suit : maux de tête, ecchymoses, démangeaisons, enflure, douleur ou rougeur au niveau de l'abdomen à l'endroit où CETROTIDE est injecté et envie de vomir (nausée).

Effets secondaires peu courants : Réactions

allergiques notamment étourdissements, pouls rapide ou irrégulier, démangeaisons (souvent au niveau de l'aîne ou des aisselles), plaques rouges en relief sur la peau qui démangent (urticaire), écoulement nasal, graves difficultés à respirer, éternuements, enflure de la langue et de la gorge, rougeur et chaleur de la peau et respiration sifflante.

En cas d'effets secondaires peu courants, cessez de prendre le médicament et consultez un professionnel de la santé immédiatement.

Effets secondaires courants : Syndrome

d'hyperstimulation ovarienne (grossissement des ovaires) : ballonnement abdominal, diarrhée, nausée, douleur dans l'abdomen, prise de poids rapide, essoufflement, vomissements.

Si vous éprouvez l'un des symptômes du syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHO), consultez votre professionnel de la santé.

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Quels sont les éléments importants dont il faut se souvenir ?

- CETROTIDE doit être entreposé à une température comprise entre 2 et 8 °C (dans un réfrigérateur). Il est permis d'entreposer ce produit à une température pouvant aller jusqu'à 30 °C pendant une période maximale de trois mois.
- **Ne le congélez pas.** Entrez-le dans un endroit frais et sec. Protégez-le contre l'humidité et la chaleur excessives. Gardez le contenant dans sa boîte pour qu'il soit à l'abri de la lumière.
- **Gardez le médicament hors de la portée de et de la vue des enfants.**
- N'utilisez pas CETROTIDE ni la seringue pré-remplie après la date de péremption imprimée sur les étiquettes et sur la boîte. Après la date de péremption, jetez le flacon et la seringue de manière appropriée.

Pour de plus amples renseignements à propos de CETROTIDE, veuillez consulter le feuillet des renseignements pour le consommateur inséré dans l'emballage du produit ou la monographie de produit la plus récente.

Vous n'êtes pas seule.

Où trouver de l'aide et de l'information?

momentum

Le programme de soutien aux patientes *MOMENTUM* est un service gratuit et confidentiel qui offre un soutien personnalisé, y compris de l'aide à l'injection, aux personnes qui utilisent les produits de fertilité d'EMD Serono.

fertility.mymomentum.ca

Notre site Web complet destiné aux patientes offre les éléments suivants :

- Un soutien technique, y compris des vidéos et des guides pratiques sur l'injection (à télécharger)
- Une foire aux questions sur les produits EMD Serono

1-800-387-8479

- Notre service d'assistance téléphonique *MOMENTUM* gratuit est ouvert en permanence.
- Les heures d'ouverture normales sont de 8 h à 20 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi.
- Un service de téléavertisseur est offert après les heures ouvrables pour les demandes urgentes qui ne peuvent pas attendre au prochain jour ouvrable. Pour les appels après les heures régulières, il suffit de laisser votre nom, la raison de votre appel et le numéro de téléphone pour vous rejoindre et une infirmière autorisée vous rappellera rapidement.

***MOMENTUM* est offert en plus de
250 langues grâce à des traducteurs agréés.**

MOMENTUM ne fournira aucun commentaire sur un diagnostic individuel, un traitement, des résultats de laboratoire, ni des produits d'un autre fabricant qu'EMD Serono. Vous devriez discuter de ces questions avec votre fournisseur de soins de santé. *MOMENTUM* est une source de soutien éducatif parrainée par EMD Serono, Canada, et ne remplace en aucun cas les discussions avec votre fournisseur de soins de santé.



Scanner le code QR pour
trouver la vidéo des instructions
sur la façon d'utiliser



Référence : Monographie de produit CetrotideMD. EMD Serono, 13 juin 2019.

© EMD Serono, 2022. Tous droits réservés.
EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada
Une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
2695 North Sheridan Way, Suite 200, Mississauga, Ontario L5K 2N6 Canada
Cetrotide est une marque déposée de Zentaris IVF GmbH, Allemagne.



 MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

**EMD
SERONO**